

## Basalkursus, opgaver vedr. simpel lineær regression

### Opgave 1: Resting Metabolic Rate

I filen (`rmr.txt`) findes sammenhørende værdier af kropsvægt (`bw`, i **kg**) og hvilende stofskifte (`rmr`, **kcal pr. døgn**) for 44 raske kvinder (Altman, 1991 og Owen et.al., 1986). Første linie indeholder variabelnavnene.

Vi ønsker at undersøge, hvordan kropsvægten påvirker stofskiftet:

1. Lav en tegning af de sammenhørende værdier af kropsvægt og stofskifte. Overvej i denne forbindelse, hvad der bør være X- hhv. Y-akse.
2. Opstil en rimelig model (evt. ved først at transformere data på passende vis, hvis du synes, modelforudsætningerne halter), og estimer parametrene i denne, med tilhørende spredninger (spredninger på parameterestimer = standard errors).
3. Hvad er estimatet for middelværdien af hvilestofskiftet for kvinder på 70 kg?  
Hvis det tilsvarende middel hvilestofskifte for mænd (på 70 kg) vides at være skønnet til 1406 kcal/døgn (med CI på 1360-1452), kan vi så konkludere, at der er forskel på hvilestofskiftet hos mænd og kvinder på 70 kg?
4. I ambulatoriet ser vi en kvinde, der vejer 80 kg.
  - Hvad er dit bedste gæt på hendes hvilestofskifte (i mangel af yderligere information)? Og indenfor hvilke grænser vil du med 95% sikkerhed tippe hendes hvilestofskifte at ligge, forudsat at hun er rask.
  - Hvis hun viser sig at have et hvilestofskifte på 950 kcal/døgn, hvilken diagnose ville du så stille, og hvorfor?
  - Er det muligt (med 95% sikkerhed) at forudsige en enkelt kvindes stofskifte udfra kropsvægten med en nøjagtighed på  $\pm 250$  kcal/døgn ?
5. Vurder om modellens forudsætninger kan siges at være opfyldt. Suppler evt. med teoretiske overvejelser omkring stofskifte.  
Til dette spørgsmål (samt til det følgende) kan man med fordel gemme

informationer fra regressionsanalysen ved at benytte **Save**-knappen i regressions-boksen, og der afkrydse de ekstra informationer, man ønsker gemt.

6. Overvej, om der muligvis er enkelte observationer, der har en speciel kraftig indflydelse på estimationen. Hvad kan/bør man gøre med sådanne?

Hvis der bliver mere tid, kan I forlyste jer med:

## Opgave 2: Definition af BMI

Vi skal se på rimeligheden i definitionen af body mass index

$$\text{BMI} = \frac{\text{vægt i kg}}{(\text{højde i m})^2}$$

og skal hertil benytte Sundby-data.

1. Transformer ovenstående teoretiske relation (altså selve formelen) med logaritmen, dvs. find et teoretisk udtryk for logaritmen til BMI.  
Hvis alle havde samme BMI, hvilken lineær relation ville vi så forvente at finde mellem de logaritmerede værdier af vægt og højde?
2. Hent nu **sundby**-data ind (denne har I brugt tidligere), og tegn et scatterplot af logaritmen til vægt (vægt er **v75**) overfor logaritmen til højde (højde er **v76**), for hvert køn for sig, og vurder forudsætningerne for at foretage en lineær regression.
3. Fit en lineær relation, med  $\log(\text{vægt})$  som respons og  $\log(\text{højde})$  som kovariat, for et af kønnene (eller hvert køn for sig).  
Hvordan passer resultatet med definitionen af bmi?
4. Hvordan kunne man forklare en evt. afvigelse fra det forventede?